



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 8 du 18 Novembre 2005
Rédigé en collaboration avec la Ferme Expérimentale de Loudes et la Chambre d'Agriculture

CEREALES

Cette année les semis ont commencé vers la mi-Octobre et se sont poursuivis jusqu'à la mi-Novembre pour la grande majorité. De ce fait les stades sont assez échelonnés. Les cultures les plus précoces sont quasiment à 3 feuilles, la plupart sont à 1-2 feuilles, les dernières semées ne sont pas encore levées.

Pucerons: les conditions météo de la première décade de novembre ont été assez douces et favorables aux premières arrivées de pucerons sur les parcelles les plus avancées mais peu nombreuses. La présence de ces ravageurs étaient parfois importantes avec des populations ailées. Par contre les conditions très pluvieuses et froides plus récentes, sans éliminer les pucerons, ont ralenti leur activité et en particulier limité leurs déplacements vers les cultures à des stades moins avancés.

Les pucerons (*Rhopalosiphum padi* en particulier) peuvent transmettre la Jaunisse nanisante. Surveillez vos parcelles, surtout les plus précoces, et n'hésitez pas à intervenir dès lors que vous constatez 5 à 10% de plantes porteuses de pucerons. Des conditions plus ensoleillées favoriseront leur activité et déplacement.

Les cultures dont les semences sont traitées avec du **Gaucha** sont normalement protégées vis à vis des pucerons.

Zabres: pour l'instant ils ne se sont pas manifestés sur les céréales. Par contre ils ont été déjà observés sur prairies (Ray grass dans la Piège). Surveillez leur apparition sur les céréales sachant que les moyens de lutte chimique sont limités et peu efficaces. Seule la deltaméthrine est homologuée. L'application doit être effectuée en soirée avec des volumes importants de bouillie. En cas de nécessité de ressemer les semences devront être enrobées.

Pour ce ravageur les mesures agronomiques sont à privilégier surtout dans les zones où il se manifeste régulièrement: travail du sol, rotations évitant blé sur blé et surtout prairies.

Limaces: attention comme toujours à ce ravageur fréquemment signalé et favorisé par des temps humides et relativement doux.

COLZA

Ces cultures sont entre les stades 4 et 8 feuilles. Après la manifestation d'Altises dans certaines situations, on n'a pas remarqué de fortes présences de larves de Tenthredines ou de Pucerons.

Quelques manifestations de vers gris et de mouches ont été signalées très ponctuellement sans incidences particulières.

CEREALES:
Attention aux pucerons surtout sur les parcelles précoces. Intervenez si présence.
A surveiller pour les autres cultures.
Zabres et limaces: à surveiller

Colloque Conseil:
Une grande enquête est lancée en partenariat avec l'AFPP et en collaboration avec DATAGRI afin de mieux cerner les acteurs du conseil en France et les besoins des agriculteurs en ce domaine.
Le questionnaire est disponible sur Internet depuis la page d'accueil du site Internet
<http://www.afpp.net>
Les résultats de cette enquête seront communiqués lors du colloque qui se tiendra le 29 novembre dans les locaux de l'APCA à Paris.
Le programme de cette journée sera diffusé et mis en ligne courant septembre en page Calendrier du site AFPP
<http://www.afpp.net/calendrier.htm>

DRAF
Service Régional de la protection des Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER
CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de Languedoc
Roussillon
Directeur gérant:
M. LARGUIER
Publication périodique
C.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582